


Полтавський державний медичний університет  
Кафедра гістології, цитології та ембріології

# ЛЕКЦІЯ. Введення до вчення про тканини. Епітеліальні тканини.

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор  
лауреат Державної премії України в галузі науки і  
техніки

Шепітько Володимир Іванович




# План лекції.

- 1.Значення тканин. Поняття про диферон, диференціювання та стовбурові клітини.
- 2.Загальна морфо-функціональна характеристика епітеліальних тканин.
- 3.Класифікація покривного епітелію. Локалізація в організмі.
- 4.Ендокринні та екзокринні залози. Принципи класифікації залоз.
- 5.Секреторний цикл. Характеристика залозистих клітин.

# організм людини – жива біологічна система

Рівень

Організації



# РОЗВИТОК І РЕГЕНЕРАЦІЯ ТКАНИН

- Тканини виникли в ході еволюції на певних етапах філогенеза. В процесі індивідуального розвитку (онтогенеза), їх джерелами слугують різні ембріональні зачатки.
- **Закономірності еволюційного розвитку тканин** викладені в теорії дивергентного розвитку тканин (Н.Г.Хлопін) і теорії паралелізмів, паралельних рядів, або паралельного розвитку тканин (А.А.Заварзін).

Розвиток кожного виду тканин (*гістогенез*) обумовлений процесами *детермінації* і *диференціювання* їх клітин.

гістогенез

детермінація

диференціювання

# **Детермінація тканин (від лат. determinatio - визначення)**

- **процес, який відбувається в ході розвитку тканин із ембріональних зачатків і є закріпляючим ("програмуючим"), притаманним кожному типу тканин напрямком даного розвитку.**

**Детермінація  
забезпечується**

**рестрикцією**

*рестрикція -  
поступове  
обмеження*

**коммітуванням**

*коммітування (англ.  
*commit* - доручати)  
запрограмована в  
певному напрямку  
диференциація або  
синтез одного  
зазначеного продукта*

# **Диференціювання**

- процес, в ході якого клітини даної тканини реалізують зафіксовані детермінацією потенції.
- При цьому вони проходять ряд стадій розвитку, поступово набуваючи структурно-функціональних властивостей зрілих елементів.
- Диференціювання клітин відбувається в зрілих тканинах і тих, які розвиваються.
- Тканина містить в своєму складі клітини різного рівня диференціювання.

# *Диферон*

- сукупність всіх клітин, які складають дану лінію диференціювання - від найменш диференційованих (стовбурових) до найбільш зрілих.
- Тканини можуть містити декілька різних клітинних диферонів, які взаємодіють між собою.

Стовбурова клітина



Напівстовбурова клітина



Клітина-попередниця



-бласти



-цити

# *Стовбурові клітини*

- найменш диференційована клітини даного виду тканини, яка є джерелом її розвитку.
- Вони є у всіх тканинах в ході ембріонального розвитку і присутні в багатьох тканинах зрілого організму.

# Олександр Олександрович Максимов (1874—1928)



- Він висунув постулат про існування стовбурової клітини крові.
- На засіданні Товариства Гематологів в Берліні 1 червня 1909 року ввів поняття «Stammzelle», маючи на увазі клітину яка має властивості стовбурової в сучасному розумінні даного слова.
- Активне запровадження метода тканьових культур в Росії, разробка гіпотези про існування «поліblastів», експериментальне обґрунтування унітарної теорії кровотворення, введення в науку поняття про стовбурові клітини – це лише незначна частка заслуг О.О. Максимова, на основі чких розроблюється сучасна клітинна біологія і регенеративна медицина не тільки в Россії, але й в усьму світі.

# **Характеристики ембріональних стовбурових клітин**


- 1. Тотіпотентність — здатність утворювати будь-яку клітину организма (у ссавців);**
- 2. Хоумінг — здатність стовбурових клітин, при введенні в організм, знаходить зону пошкодження і фіксуватись там, виконуючи втрачену функцію;**
- 3. Фактори, які визначають унікальність стовбурових клітин, знаходяться в цитоплазмі. Це надлишок мРНК всіх 3 тисяч генів, які відповідають за розвиток зародка;**

**4. Теломеразна активність.** При кожній реплікації частина теломер втрачаються (ліміт Хейфліка або біогодиника). В стовбурових, статевих і пухлинних клітинах є теломеразна активність, кінці їх хромосом надбудовуються, тобто ці клітини здатні проходить потенціально безкінечну кількість поділів.


- Стовбурових клітин в нашему организмі дуже мало:
  - у ембріона — 1 клітина на 10 тисяч,
  - у людини в 60-80 років — 1 клітина на 5-8 міліонів.

# *Найважливіші властивості стовбурових клітин:*

1. утворюють самопідтримуючу популяцію;
2. діляться нечасто;
3. стійкі до дії пошкоджуючих факторів;
4. може бути джерелом розвитку декількох диферонів.




### Стволовая эпендимная клетка





- Ділиться дуже рідко з утвореням швидко проліферуючих попередників, які мігрують в субвентрикулярну зону і диференціюються в нейрони і глію. Фактор росту фібробластів 2 (FGF2), фактор росту епідерміса (EGF) і пошкодження тканини стимулює мітози стовбурової нейральної клітини і її мультипотентних нащадків.


# Отримання стовбурових ембріональних клітин



- Запліднену *in vitro* яйцеклітину культивують до стадії бластицисти, яка утворена приблизно 200–250 клітинами, 30–34 із яких відносяться до внутрішньої клітинної маси.
- Далі методом імунохірургії трофектодерму відділяють від внутрішньої клітинної маси.
- Отримані клітини вирощують на підкладці із опромінених фібробластів миші в культивованому середовищі, які містять яловичину сиворотку.
- Через серію багаточмельніх пасажів клітин, які розмножуються утворюються чисті клітинні лінії, здатні до формування шароподібних структур — ембріоїдні тіла.



# Ембріональні стовбурові клітини людини під мікроскопом




## Ембріональна статева клітина

- Ембріональні статеві клітини виділяють із ембрійдних тіл, які формуються при культивуванні примордіальних (первинних) статевих клітин, отриманих із статевих валиків ембріона на 5–9-й тиждень розвитку.
- За допомогою різних факторів росту із ембріональних статевих клітин отримані спеціалізовані клітини — похідні всіх трьох зародкових листків.

# Стовбурові клітини дорослого організма

- Стовбурові клітини дорослого организма виділені із:
  - червоного кісткового мозку,
  - периферійної крові,
  - пульпи зуба,
  - спинного и головного мозку,
  - кровоносних судин,
  - скелетної мускулатури,
  - епітелія шкіри і травної системи,
  - рогівки і сітківки ока,
  - печінки і підшлункової залози.

## ■ Шляхи міграцій стовбурових клітин дорослого організма.




- Тканинноспецифічні стовбурові клітини у відповідному мікрооточенні диференцуються у клітини даної тканини.
- Але при цьому стовбурові клітини зберігають здатність до міграції.
- Вони можуть виходити в загальний кровоплин, після чого, стовбурові клітини, або портаються до вихідного місця, або виселяються в інші тканини, де трансдиференцуються в специфічні для цієї тканини стовбурові клітини.

# Думки лежачи на дивані

- Стовбурова клітини – низько диференційована і мало комітована клітина.
- Стовбурова клітина має високі поліферативні потенції, але, як правило, ділиться рідко.
- Стовбурових клітин в нашему організмі дуже мало :
- у ембріона — 1 клітина на 10 тисяч,
- у людини у 60-80 років — 1 клітина на 5-8 міл.
- До сьогоднішнього дня плюріпотентна стовбурова клітина дорослого организма, яка здатна до відтворення всіх клітинних типів організму, не виявленена!!!
- Стовбурові клітини важко відрізняти від диференційованих клітин у складі зрілих тканин.
- Стовбурову клітину важко ідентифікувати і ізолювати, а в культурі вони мають обмежену кількість мітозів.

# ФІЛАТОВ Володимир Петрович (1875-1956)



- офтальмолог і хірург, аcadемік АН України (1939) и АМН СРСР (1944), Герой Соціалістичної Праці (1950). Розробив методи:
- пластики шкірним стеблем (1917),
- пересадки рогівки (1924),
- тканинної терапії (1933).
- створив вчення про біогенні стимулятори.
- Державна премія СРСР (1941).

# ГРИЩЕНКО Валентин Іванович



- Акушер-гінеколог, хірург.
- Академік Національної академії наук України.
- Державна премія СРСР (1988).
- Державні премії України в області науки і техніки (1992, 2002).
- Директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
- Завідуючий кафедрою акушерства і гінекології Харківського медичного університету.
- Розробив методи низькотемпературного консервування біологічних об'єктів.
- Використання кріоконсервованих препаратів ембріофетоплацентарного комплекса при лікуванні різної патології.


# Полтавський регіональний центр клітинної і тканинної трансплантації

Полтавське відділення  
Українського національного  
банка біологічних об'єктів









# Український національний банк біологічних об'єктів







# Клінічне використання

- Технологія ембріональних стовбурових клітин може бути використана для лікування таких захворювань, як:
  - інсулін-залежний цукровий діабет (тип I, підлітковий діабет),
  - хвороба Паркінсона,
  - незавершений остеогенез,
  - м'язева дистрофія Дюшена,
  - пошкодження спинного мозку,
  - серцева недостатність та ін.

- Для безпечної трансплантації стовбурових клітин необхідно виключити будь-який можливий негативний вплив трансплантованих клітин на організм реципієнта.
- Підготовлені для трансплантації стовбурові клітини повинні мати певні характеристики:
  - активно розмножуватися з утворенням достатньої кількості клітин для відновлення втраченої тканини;
  - диференціюватися в необхідні клітинні типи;
  - зберігати здатність до життя;
  - інтегруватися з клітинами органа-реципієнта;
  - виконувати властиві для органа-реципієнта функції.

- Головним моментом у диференціюванні клітинних структур зачатків вважають відокремлення клітин в групи або території, які характеризуються тим, що відокремлені клітини набувають здатність до виконання основних функцій організма.
- Даний момент в ембріогенезі вважають початком диференціювання тканинних систем.

- З даної точки зору ми повинні називати тканиною таку систему клітинних елементів, яка виконує в організмі деяку основну функцію, у відповідності до якої розвивається і її будова, і її подальше диференціювання.
- Морфологічно одна тканинна система відрізняється від іншої формою і будовою клітин, розвитком між ними окремих зв'язків і відношенням до проміжної речовини, яка дуже рано появляється між клітинами і представляє собою продукт їх життєдіяльності.

*Напрямок розвитку окремих тканинних систем визначається основними функціями організма, які характеризують основні функції і властивості протоплазми.*

**Це наступні функції:**

- здатність до сприймання і передачі подразника;
- здатність до скорочення;
- здатність до сприймання і вироблення речовин;
- здатність розвивати структури, які забезпечать міцність організму;
- здатність до к бар'єрної функції, тобто по поверхні (на межі розділення середовища) розвивати структури, які забезпечують збереження роботу внутрішніх частин організма.

- **Тканина** – це сформована в процесі еволюції система гістологічних елементів (клітин і проміжної речовини), яка складається із однієї або декількох диферонів клітин і їх похідних, поєднаних спільним походженням, будовою і мають специфічні функції внаслідок кооперативної діяльності всіх її ланок.

## Класифікації:

- Л.Лейдіг (1853) розділив тканини на 4 групи: 1) епітеліальні; 2) сполучні; 3) м'язеві; 4) нервову тканину.
- А.А.Заварзін – запропонував "теорію паралельних рядів", відповідно якій еволюція тканин йшла у різних типів і класів животних паралельних рядів для забезпечення чотирьох функцій організму – розмежування, трофіки, руху і регуляції. Виникли 4 типи тканин: 1) розмежувальні, 2) тканини внутрішнього середовища, 3) м'язеві і 4) нервові тканини.
- І.Т.Хлопіним була разроблена теорія дивергентної еволюції тканин, за якою різnobічність тканин виникає в онтогенезі як результат генетичної детермінації вихідних однорідних клітинних груп.

Сучасна класифікація тканин, яка поєднує в собі еволюційно-функціональний і генетичний підхід, включає в себе **чотири** **типа тканин**, кожен з яких складається із певної кількості видів.

## тканина

клітини

похідні клітин

міжклітинна речовина

**симпласт**  
(м'язеві волокна,  
трофобласт)

**синцитій**  
(сперматозоїди,  
пульпа емалевого  
органу)

**постклітинні  
структури**  
(еритроцити, тромбоцити,  
зрогов. лусочки  
епідерміса)

**основна  
речовина**  
(золь, гель)

**волокна**  
(ретикулярні,  
колагенові,  
еластичні)

■ **СИМПЛАСТ** (від гр. *syn* - замість и *plastos* – утворений ) – це структури, утворені в результаті *злиття клітин* із втратою їх меж і формуванням єдиної цитоплазматичної маси, в які знаходяться ядра.

Симпласти мають відмінність від морфологічно подібними до них багатоядерних клітин, останні виникають в результаті повторного ділення клітин без цитотомії.

До симпластів відносять:

- остеокласти,
- зовнішній шар трофобласта,
- волокна скелетної м'язової тканини (останні містять також і клітини).

■ **СИНЦИТІЙ** - (від гр. syn - разом і cytos, або kytos, - клітина) сіткоподібна структура, яка виникає за рахунок *неповної цитотомії* при діленні клітин із збереженням зв'язку між її елементами завдяки цитоплазматичним місткам.

Єдиний «істинний» синцитій в організмі людини представлений частиною сперматогенічних елементів в сім'яних канальцях яєчка. В закордонній літературі терміном «синцитій» позначають і симпластичні структури, а термін «симплласт» практично не використовують.

## Класифікація тканин за А.А.Заварзіним

Тканини загального  
характеру

Тканини  
спеціалізовані

**Розмежувальні  
тканини**

Тканини  
внутрішнього  
середовища

Тканини  
м'язової систем


Тканини  
нервової системи

# ЕПІТЕЛІЙ –

це тканина, яка розташована на  
межі між організмом і  
внутрішнім середовищем,  
одночасно забезпечує зв'язок  
між ними.

# ОЗНАКИ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО ШАРУ:

1. Епітелій завжди знаходиться на межі двох середовищ.
2. Епітелій представляє собою шар клітин.
3. Існує асиметрія в пласті клітин (полярність).
4. Відсутність міжклітинної речовини.
5. Відсутність кровоносних і лімфатичних судин.
6. Епітеліальний пласт відмежовується від прилеглих тканин базальною мембраною.
7. Епітелій має високу здатність до регенерації.
8. В епітеліях представлені усі види міжклітинних контактів.






# СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНЯХ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН:

**1. АПІКАЛЬНА** – та, яка повернена у просвіт (судини, бронхів, кишківника і т.д.), протилежна базальній.


■ **На цій поверхні можуть утворюватися мікроворсинки ( $d=100$  нм), в яких знаходяться філаменти. Війки і жгутиki ( $d=200$  нм), в основі їх знаходяться базальні тільця, а в тілі – мікротрубочки.**



# СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНЯХ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН:

**2.БАЗАЛЬНА** – та, яка контакує з базальною мемраною.


- На ній зустрічаються мікроворсинки або випинання для збільшення робочої поверхні контакта з прилеглими тканинами.



# СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНЯХ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН:

**3.БІЧНА** – поверхня контакту між двома сусідніми клітинами.


■ На них розташовуються міжклітинні контакти, а також утворюються складки – інтердигітації (запас поверхнні).



# БАЗАЛЬНА МЕМБРАНА

В шарі міжклітинної речовини розрізняють три пластинки у напрямку від епітелія до сполучної тканини:

- **СВІТЛА ПЛАСТИНКА** – шириною 30-50 нм, складається із якорних філаментів, глікопротеїнів (ламінін), антигена пухирчатки і протеогліканів.
- **ЩІЛЬНА ПЛАСТИНКА** – у ній розташовані якорні фібрили у вигляді петель, а також колаген IV, V, VII типів, фібронектин.
- **РЕТИКУЛЯРНА ПЛАСТИНКА** – складається із коллагена I і III типу, фібрили якого фіксовані до якорних філаментів.



# Функції базальної мембрани

- Підтримка архітектоніки, диференціювання і поляризація епітелія.
- Забезпечення міцних зв'язків з прилеглими ткайнами.
- Вибіркова фільтрація поживних речовин (молекулярне сито).
- Забезпечення і регуляція роста і руху епітелія.



# КЛАСИФІКАЦІЇ ЕПІТЛІАЛЬНИХ ТКАНИН

Онтофілогенетична класифікація засновується на походженнях різних типів епітелія із різних зародкових листків

**ектодерма**

**епі-  
дермальний**

**епендимо-  
гліальний**



**Шкірний епітелій** (епідермальний)-  
проходить із ектодерми; за будовою –  
багатошаровий або  
псевдобагатошаровий, локалізація -  
шкіра, ротова порожнина, стравохід,  
рогівка ока, піхва, анус;

**функція - захисна.**


**Епендімогліальний** – походить із  
нервової трубки; за будовою -  
одношаровий; локалізація - вистилає  
порожнини мозку;

**функція - розмежувальна.**

**мезодерма**

**целонефро-  
дермальний**

**ангіо-  
дермальний**




**Целомічний** – походить із спланхнотомів мезодерми; за будовою - одношаровий плоский; локалізація - серозні оболонки; функція - розмежувальна.

**Нирковий** - (нефродермальний)-походить із проміжної мезодерми; за будовою - одношаровий; локалізація - ниркові канальці; функція - реабсорбція речовин із первинної сечі в кров.

**Ангіодермальний** (ендотелій) – походить із мезенхіми і не є власне епітелієм; за будовою - одношаровий плоский; локалізація - вистилає кровоносні і лимфатичні судини, серце; функція - захисна, всмоктуюча.

# ентодерма

енто-  
дермальный



**Кишковий** (ентеродермальний) –  
пходить із ентодерми; за будовою -  
одношарови призматичний;  
локалізація - шлунок, тонкий і товстий  
кишечник;  
**функція - всмоктування.**

# ФУНКЦІОНАЛЬНА

## ПОКРИВНІ

епідерміс

мезотелій

вистилка  
бронхів

эпителий  
почечных  
канальцев

## СЕНСОРНІ

орган слуху

орган  
рівноваги

нюховий  
епітелій

орган вкуса

## ЗАЛОЗИСТІ

кишковий  
епітелій

епітелій  
слинних залоз

епітелій  
молочних залоз

гепатоциты

# морфологічна класифікація поверхневих епітеліїв

**поверхневі  
епітелії**

**одношаровий  
(прості)**

**багатошарові**

**одношарові  
(прості)**

**однорядний**

**багаторядний  
(псевдо-  
багатошаровий)**

**плоский**

**призматичний**

**кубичений**

**призматичний**

## **багатошарові епітелії**

**перехідний**

**незроговілий**

**зроговілий**

**плоский**

**плоский**

**кубичний**




**призматичний**

# Одношаровий плоский епітелій (epithelium simplex sqamosum)(ендотелій, мезотелій)

- **Ендотелій** - вистиляє кровеносні і лімфатичні судни, а також камери серця. Він представляє собою шар плоских клітин - ендотеліоцитів, які лежать в один шар на базальній мембрани.
- **Ендотеліоцити** - клітини полігональної форми з волнистими нерівними краями. Часть клітин мають 2-3 ядра. Відносно бідні органелами і мають в цитоплазмі піноцитозні везикул.
- **Функція** - трансендотеліальне перенесення кисню, вуглекислого газу та інших речовин. Приймає участь в місцевій регуляції кровопливу.

- **Мезотелій** - вкриває серозні оболонки (листки плеври, вісцеральну і парієтальну брюшину, навколосерцеву сумку).
- **Мезотеліоцити** - плоскі клітини, полігональної форми з нерівними краями. Місця залягання ядер клітини трохи потовщені. Деякі містять 2, інколи 3 ядра. На вільній поверхні клітини є пооднакі мікроворсинки.
- **Функція** - через мезотелій відбувається виділення і всмоктування серозної рідини. Завдяки його гладкій поверхні легко відбувається ковзання внутрішніх органів, запобігає утворенню сполучнотканинних спілок між органами в грудній і брюшній порожнинах.

# Одношаровий епітелій




## Плоский епітелій (мезотелій сальника)

1 – епітеліоцит, 2 – базальна мембрана, 3 – сполучна тканина, 4 – кровоносна судина, а) – ядро, б) – мікроворсинка, в) – міжклітинна межа, г) – щільний контакт, д) – простий контакт, е) – десмосома, ж) – напівдесмосома

# Одношаровий кубічний епітелій (epithelium simplex cuboideum)

- Вистилає частину ниркових каналців (проксимальні і дистальні), вивідні протоки багатьох залоз, дрібних бронхів. Клітини цього епітелія мають однакові розміри за висотою і ширину. Клітини проксимальних відділів ниркових каналців мають облямівку і базальну посмугованість. Посмугованість обумовлена концентрацією мітохондрій в базальних відділах клітин.
- **Функція** – виконує функцію зворотнього всмоктування (реабсорбцію) ряду сполук із первинної сечі в кров.

# Одношаровий епітелій



Кубічний епітелій (ниркові канальці)



1 – епітеліоцит, 2 – базальна мембрана, 3 – сполучна тканина

# Однослойный призматический (цилиндрический) (epithelium simplex columnare)

Различают :


- **з облямівкою** - в кишківнику, жовчному міхурі, його клітини мають всмоктуючу поверхню. Клітини призматичні, серед яких зустрічаються келихоподібні.
- **мерхтливий** - в маткових трубах, його клітини мають мерхтливі війки, які сприяють руху яйцеклітини.
- **залозистий** - у шлунку, його клітини здатні продукувати секрет слизового характеру і називають гландулоцитами.
- Поряд з названими клітинами існують **базально-зернисті ендокринні клітини** декількох видів і **апікально-зернисті залозисті клітини**, гормони яких регулюють функцію органів травного тракту.

# Одношаровий епітелій



Призматичний мікроворсинчатий епітелій (тонкая кишка); I – кишечна мікроворсинка.

1 – епітеліоцит, 2 – базальна мембра, 3 – сполучна тканина, 5 – келихоподібний экзокриоцит, а) – ядро, б) – мікроворсинка, в) – міжклітинна межа, г) – щільний контакт, д) – простий контакт, е) – десмосома, ж) – напівдесмосома, и) – облямівка



# Одношаровий багаторядний (багатошаровий) (epithelium pseudostratificatum)

- Вистилають повітроносні шляхи і деякі відділи статевої системи.
- В цьому епітелії розрізняють 4 вида клітин
  1. **Війчасті** (миготливі) клітини мають, вузька частина клітини прикріпляється до базальної мембрани, а широка виходить на поверхню епітелія і має війки.
  2. **Короткі і довгі вставні клітини**, напевно, є стовбуровими, здатні до ділення и перетворюються на війчасті і слзові клітини. Вставні клітини мають форму клина і широкою частиною прикріпляються до базальної мембрани, вузька вклинується між війчастими клітинами, не досягаючи поверхні епітелія.




**3. Слизові клітини келихоподібної форми,**  
виробляють муцини на поверхню епітелія.

**4. Ендокринні** (базально-зернисті)  
продукують біологічно активні речовини  
(гормони).

Завдяки різному розташуванню  
вставних і війчастих клітин в даному епітелії  
можна виділити три ряди ядер:

- **нижній і средній ряди - ядра вставних клітин,**
- **верхній ряд - ядра війчастих клітин.**


# Багаторядний війчастий епітодій



Трахея

- 1 – війчастий епітеліоцит (а – війка);
- 2 – келихоподібний екзокрионоцит (слизовий секрет);
- 3 – вставний епітеліоцит;
- 4 – базальний епітеліоцит;
- 5 – ендокриноцит;
- 6 – базальна мембрана;
- 7 – сполучна тканина;
- 8 – кровоносна судина






ТЕМ війок. I – поперечний, II – повздовжній

1 – клітинна мембрана; 2 – цитоплазма; 3 – периферичний дуплет мікротрубочок; 4 – центральні мікротрубочки; 5 – базальне тільце 6 – цитоплазма верхівки клітини

# Багатошаровий незроговілій плоский епітелій (epithelium stratificatum squamsum noncornificatum)

- Локалізований в рогівці ока, ротовій порожнині, стравоході, піхві, анальній частині прямої кишки.
- В цьому епітелії виділяють 3 шари клітин:
- **базальний шар** утворений епітеліоцитами призматичної форми, які розташовані на базальній мембрані. Серед цих клітин є стовбурові, здатні до ділення. Тому його ще називають камбіальним.
- **шипуватий шар** утворений епітеліоцитами полігональної форми, які мають відростки, які вдаються між апікальною частиною клітин базального шару. Ці улітини розташовуються декількома шарами і мають цитоплазматичні відростки які нагадують шипи.
- **шар плоских клітин**, який розташовується на поверхні і представляє собою клітини, що відмирають.

# Незроговільний епітелій



- 1 – базальна мембрана;
- 2 – базальний шар;
- 3 – шипуватий шар;
- 4 – поверхнвий шар (а),
- 8 – сполучна тканина;


# Багатошаровий плоский зроговілий епітелій (epithelium stratificatum sqamosum cornificatum )

- покриває поверхні шкіри і назвається епідермісом в якому відбувається процес перетворення (трансформація) епітеліальних клітин у рогові лусочки – зроговіння. Зроговіння супроводжується синтезом і нагромадженням специфічних білків-кератинів.
- Епідерміс шкіри долоней, підошв має 5 шарів:
  1. **Базальний** (ростковий, камбіальний) – утворений циліндричними епітеліоцитами, в цитоплазмі яких синтезуються специфічні білки, формуючий тонофіламенти. Тут розташовуються стовбурові клітини, які діляться, після чого частина диференцюється і переміщується у поверхневі шари.

2. **Шиповий** – утворений полігональної форми клітинами, які тісно пов’язані між собою багаточисельними десмосомами. В місці десмосом на поверхні клітин є дрібні вирости – шипики. Цитоплазма цих клітин має тонофіламенти, які утворюють пучки тонофібріл. Даний шар містить віростчаті за формуєю пігментні клітини - меланоцити. В цитоплазмі яких є гранули пігмента - меланіна, а також макрофаги, дендроцити і лімфоцити, які утворюють в епіремісі місцеву імунного нагляду. Клітини даного шару здатні до мітотичного поділу, в зв’язку з чим цей шар відносять до росткового разом з епітеліоцитами базального шару.
3. **Зернистий шар** – утворений сплощеними клітинами, цитоплазма яких містить тонофібріли і зерна кератогіаліна. Кератогіалін - фібрілярний білок, який перетворюється в елеїдин у клітинах, які лежать вище, а потім в кератин. Крім того, в цитоплазмі клітин даного шару виявляються особливі тільця - кератосоми, які представляють собою різновид лізосом.

4. **Блискучий шар** - утворений плоскими клітинами, цитоплазма яких містить елеїдин, який переломлює світло, що представлений комплекс кератогіаліну з тонофібрилами.
5. **Роговий шар** – утворений роговими лусочками, заповненими кератином і пухирцями повітря. По мірі того як клітини блискучого шару переміщаються у роговий, в них при участі лизосом поступенно зникають ядра і органели, з'являється кератин и клітини перетворюються на рогові лусочки. Клітини, які знаходяться ззоввтрачаються зв'язок під впливом ферментів лізосом і поступово відпадають з поверхні епітелія.

# Зроговільний епітелій





- 1 – базальна мембрана;
- 2 – базальний шар;
- 3 – шиповатий шар;
- 4 – поверхневий шар  
зернистий - (б);
- 5 – блискучий шар;
- 6 – роговий шар;
- 7 – вивідно протока  
потової залози;
- 8 – сполучна тканина;
- 9 – кровеносна судина;

# Переходний епітелій (epithelium transitionale)

- вистилає сечовивідні шляхи - лоханки нирок, мочеточники, чоловоди, сечовий міхур. Утворений з шарами клітин:
  1. **Базальний** – утворений дрібними округлими (темними) клітиами
  2. **Проміжний** – утворений клітинами полігональної форми
  3. **Поверхневий** – утворений великими клітинами, які містять 2 і 3 ядра, мають куполоподібну і сплющену форму.

# Переходний епітелій



Сечовий міхур

А – нерозтягнута стінка; Б – розтягнута стінка

1 – поверхневий шар (а – епітеліоцит); 2 – проміжний шар; 3 – базальний шар; 4 – базальна мембрана; 5 – сполучна тканина; 6 – кровоносна судина.

## екзокринні залози

прості  
(розгалужені,  
нерозгалужені)

складні  
(розгалужені,  
нерозгалужені)

трубчасті


трубчасті

альвеолярні

альвеолярні

трубчасто-  
альвеолярні

# Багатоклітинні залози



Будова екзокринних залоз. І – прості;

1 – трубчаста нерозгалужена;


2 – трубчаста розгалужена;

3 – альвеолярна нерозгалужена;

4 – альвеолярна розгалужена;

а – епітелій; б – виводна протока; в – кінцевий віддел; г –

гландулоцит.




Будова екзокринних залоз. ІІ – складна

5 – альвеолярно-трубчаста;

6 – альвеолярна;

а – епітелій; б – вивідна протока; в – кінцевий відділ; г – гландулоцит.



Будова ендокринних залоз.


7 – трабекулярна;

8 – дифузна;


9 – фолікулярна;

Г – гландулоцит; д – гемокапіляр.


# Кінцеві відділи залоз



серозний (білковий)




слизистий (мукоzний)



змішаний (серомукозний)


1 – сероцит; 2 – мукоцит; 3 – серозний напівмісяць;  
4 – просвіт ацинуса

# Типи секреції




I – мерокриновий тип; II – мікроапокриновий тип; III – макроапокриновий тип; IV – голокриновий тип

1 – гранулярна ЕПС; 2 – компл. Гольджі; 3 – мітохондрія; 4 – секреторний продукт; 5 – відрив апікальної частини з секретом; 6 – камбіальна клітина; 7 – сальний екзокриноцит ( себоцит ); 8 – екзокриноцит, який руйнується; 9 – щільний контакт; 10 – десмосома; 11 – відновлення плазмолеми; 12 – просвіт залози (а – розчинення секреторної гранули)



1 – гранулярна ЕПС; 2 – компл. Гольджі; 3 – мітохондрія; 4 – секреторний продукт; 5 – відрив апікальної частини з секретом; 6 – камбіальна клітина; 7 – сальний екзокриноцит (себоцит); 8 – екзокриноцит, який руйнується; 9 – щільний контакт; 10 – десмосома; 11 – відновлення плазмолеми; 12 – просвіт залози (а – розчинення секреторної гранули)


# Одноклітинна внутріепітеліальна залоза



Тонка кишка.


1 – келихоподібний екзокриноцит; 2 – ядро; 3 – слизовий секрет; 4 – мікроворсинчастий епітеліоцит; 5 – базальна мембра на; 6 – сполучна тканина; 7 – комп. Гольджі; 8 – мікроворсинки.

# Багатоклітинні залози



Прості:

- I – Нерозгалужена трубчаста залоза (ендометрій матки);
  - II – Розгалужена альвеолярна (сальна залоза шкіри)
- 1 – залоза; 2 – гландулоцити; 3 – вивідна протока; 4 – альвеолярні кінцеві відділи; 5 – базальні екзокриноцити (себоцити); 6 – сальні екзокриноцити (себоцити); 7 – клітини, які руйнуються; 8 – сполучна тканина; 9 – кровеносна судина; 10 – волосся; 11 – покривний епітелій; 12 – міоепітеліоцит.



Складна розгалужена альвеолярно-трубчаста залоза  
(стравохід)

3 – вивідна протока; 4 – альвеолярні кінцеві відділи;

8 – сполучна тканина

# Перелік питань до дискусії

1. На препараті виявлені такі структури: а) пласт клітин, які тісно прилягають одна до одної, б) клітини, розділені міжклітинною речовиною. Яка з цих структур відноситься до епітеліальних тканин?
2. На препараті виявлено два типи клітин. В першому випадку апікальна і базальна частини відрізняються за будовою, клітини другого типу не мають полярності. Які клітини відносяться до епітеліальних?
3. НЗ-тимідином помічені хромосоми в клітинах ектодерми. В епітелії яких органів буде виявлена мітка?
4. НЗ-тимідином помічені хромосоми в клітинах центральної мезодерми і нефротому. В епітелії яких органів буде виявлена мітка?
5. НЗ-тимідином помічені хромосоми в клітинах ентодерми. В епітелії яких органів буде виявлена мітка?

# Список літератури

1. Гістологія, цитологія. ембріологія. / За ред. О.Д. Луцика, Ю.Б.Чайковського // Підручник. Вінниця «Нова книга», - 2018. – 591 с.
2. Афанасьев Ю.И. Гистология / Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной // - М.:Медицина, -1983,1989,1999, 2012.
3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология / В.Л. Быков // - Санкт-Петербург, - 1999.
4. Барінов Е. Ф. Цитологія і загальна ембріологія. / Під ред. Е.Ф.Барінова, Ю.Б.Чайковського // Навчальний посібник. Київ, ВСВ «Медицина», - 2010.- 216 с.
5. Волков К. С. Ультраструктура клітин і тканин / К.С. Волков, Н.В. Пасєчко // Атлас. Тернопіль. Укрмедкнига, -1997.- 93 с.
6. Луцик О. Д. Гістологія людини // О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак, Ю.Б. Чайковський // Підручник. Київ „Книга-плюс”, - 2010. – 582 с.
7. Чайковський Ю.Б. Гістологія, цитологія та ембріологія / Ю.Б. Чайковський, Л.М. Сокуренко // Атлас для самостійної роботи студентів. Луцьк, - 2006.- 152 с.

# Контактна інформація:

- ШЕПІТЬКО Володимир Іванович
- 0505923182
- [svi.umsa@gmail.com](mailto:svi.umsa@gmail.com)
- Борута Наталія Володимирівна
- 0509582691
- [boruta.nata@ukr.net](mailto:boruta.nata@ukr.net)

**Дякую за увагу!**